

Miejsce na identyfikację szkoły
---------------------------------

# ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA

**POZIOM ROZSZERZONY**

**Czas pracy: 180 minut**

**LISTOPAD  
2013**

## Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 1.–12.). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym.
3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku.
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
7. Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania.
8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora.

*Życzymy powodzenia!*

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie **50 punktów**.

Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PESEL ZDAJĄCEGO**

--	--	--

**KOD  
ZDAJĄCEGO**

**Zadanie 1. (4 pkt)**

Wykaż, że dla dowolnej wartości parametru  $m$  równanie:  $-x^2 + (2m^2 + 3)x - m^4 - 1 = 0$  ma dwa różne pierwiastki dodatnie.



Odpowiedź: .....

**Zadanie 2. (5 pkt)**

Narysuj wykres funkcji:  $f(x) = \begin{cases} -2^{x+1} + 2, & \text{dla } x \leq 0 \\ -|x - 4| + 4, & \text{dla } x > 0 \end{cases}$

Określ liczbę rozwiązań równania  $|f(x)| = m$  w zależności od parametru  $m$ .



Odpowiedź: .....

**Zadanie 3. (4 pkt)**

O wielomianie  $W(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c$  wiadomo, że liczba 1 jest jego pierwiastkiem dwukrotnym oraz że  $W(x)$  jest podzielny przez dwumian  $x + 2$ . Oblicz współczynniki  $a, b, c$ . Dla obliczonych wartości  $a, b, c$  rozwiąż nierówność  $W(x + 1) < 0$ .



Odpowiedź: .....

**Zadanie 4. (3 pkt)**

Liczby  $a, b, k$  są całkowite i  $k$  jest różna od zera. Wykaż, że jeśli liczby  $a + b$  oraz  $a \cdot b$  są podzielne przez  $k$ , to liczba  $a^3 - b^3$  też jest podzielna przez  $k$ .



Odpowiedź: .....

**Zadanie 5. (4 pkt)**

Określ dziedzinę funkcji:  $f(x) = \sqrt{\log_2 \left( \log_{\frac{1}{3}}(x+1) \right)}$ .



Odpowiedź: .....

**Zadanie 6. (5 pkt)**

Wiedząc, że ciąg  $(a_n)$  jest ciągiem arytmetycznym oraz wyraz ogólny ciągu  $(b_n)$  określony jest wzorem  $b_n = 5^{a_n}$ , wykaż, że ciąg  $(b_n)$  jest ciągiem geometrycznym. Wyznacz, w zależności od  $n$ , iloczyn  $b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \cdot \dots \cdot b_n$ , przyjmując, że pierwszy wyraz ciągu  $(a_n)$  jest równy 1, a jego różnica jest równa 3.



Odpowiedź: .....

**Zadanie 7. (5 pkt)**

Rozwiąż równanie:  $\sin x |\cos x| = 0,25$ , gdzie  $x \in \langle 0, 2\pi \rangle$ .



Odpowiedź: .....



**Zadanie 8. (4 pkt)**

Okrąg o środku  $A$  i promieniu długości  $r$  jest styczny zewnętrznie do okręgu o środku  $B$  i promieniu długości  $R$  ( $R > r$ ). Prosta  $k$  jest styczna jednocześnie do obu okręgów i tworzy z prostą  $AB$  kąt ostry  $\alpha$ . Wyznacz  $\sin \alpha$  w zależności od  $r$  i  $R$ .



Odpowiedź: .....

**Zadanie 9. (4 pkt)**

W trójkącie  $ABC$  punkty  $K = (2, 2)$ ,  $L = (-2, 1)$ , i  $M = (-1, -1)$  są odpowiednio środkami boków  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$ . Wyznacz współrzędne wierzchołków trójkąta  $A'B'C'$ , który jest obrazem trójkąta  $ABC$  w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych.



Odpowiedź: .....

**Zadanie 10. (4 pkt)**

W trójkącie  $ABC$  kąt przy wierzchołku  $B$  jest ostry, długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie jest równa 5 oraz  $|AC|=6$ ,  $|AB|=10$ . Na boku  $BC$  wybrano taki punkt  $K$ , że  $|BK|=2$ . Oblicz długość odcinka  $AK$ .



Odpowiedź: .....

**Zadanie 11. (4 pkt)**

W zielonym pudełku jest 10 monet pięciozłotowych i 5 monet dwuzłotowych, a w białym pudełku są 2 monety pięciozłotowe i 3 monety dwuzłotowe. Z zielonego pudełka losujemy jedną monetę i wrzucamy ją do białego pudełka. Następnie z białego pudełka losujemy jednocześnie 2 monety. Oblicz prawdopodobieństwo, że z białego pudełka wylosujemy w sumie 7 złotych.



Odpowiedź: .....

**Zadanie 12. (4 pkt)**

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość  $a$ . Ostrosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy i wierzchołek ostrosłupa. Płaszczyzna tego przekroju tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze  $\alpha$ . Oblicz objętość tego ostrosłupa.



Odpowiedź: .....

**BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)**


A large rectangular grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares. The grid is intended for rough work (brudnopis) during the exam.

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI  
Próbna Matura z OPERONEM

**Matematyka**  
**Poziom rozszerzony**

Listopad 2013

W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w nim nieprzewidziane.

Numer zadania	Modelowe etapy rozwiązywania zadania	Liczba punktów
1.	Postęp: zapisanie tylko warunków: $x_1 \cdot x_2 > 0$ i $x_1 + x_2 > 0$	1 pkt
	Istotny postęp: zapisanie warunków: $\Delta > 0$ i $x_1 \cdot x_2 > 0$ i $x_1 + x_2 > 0$	2 pkt
	Pokonanie zasadniczych trudności: zastosowanie wzorów Viete'a i wyznaczenie: $\Delta = 12m^2 + 5$ , $x_1 \cdot x_2 = m^4 + 1$ , $x_1 + x_2 = 2m^2 + 3$	3 pkt
	Rozwiązanie bezbłędne: zauważenie, że wszystkie warunki $\Delta = 12m^2 + 5 > 0$ , $x_1 \cdot x_2 = m^4 + 1 > 0$ , $x_1 + x_2 = 2m^2 + 3 > 0$ zachodzą dla $m \in \mathbb{R}$	4 pkt
2.	Istotny postęp: poprawne narysowanie każdej części wykresu, niekoniecznie uwzględniając dziedzinę	2 pkt (po 1 pkt za każdą część)
	Pokonanie zasadniczych trudności: sporządzenie całego wykresu funkcji $y = f(x)$	3 pkt
		
Rozwiązanie bezbłędne: zapisanie 0 rozwiązań dla $m \in (-\infty, 0)$ , 1 rozwiązanie dla $m \in (4, +\infty)$ , 2 rozwiązania dla $m \in \{0, 4\}$ , 3 rozwiązania dla $m \in (2, 4)$ , 4 rozwiązania dla $m \in (0, 2)$ .	5 pkt (4 pkt, jeśli popełniono jeden błąd)	

Matematyka. Poziom rozszerzony  
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”


Numer zadania	Modelowe etapy rozwiązywania zadania	Liczba punktów
3.	Postęp: zapisanie: $W(x) = 2(x-1)^2(x+2)$	1 pkt
	Istotny postęp: uporządkowanie postaci iloczynowej i porównanie: $2x^3 + ax^2 + bx + c = 2x^3 - 6x + 4$ wyznaczenie: $a = 0, b = -6, c = 4$	2 pkt
	Pokonanie zasadniczych trudności: zapisanie wielomianu: $W(x+1) = 2x^3 + 6x^2$	3 pkt
	Rozwiązanie bezbłędne: rozwiązanie nierówności i zapisanie zbioru rozwiązań: $(-\infty, -3)$	4 pkt
4.	Postęp: zapisanie: $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$	1 pkt
	Pokonanie zasadniczych trudności: przekształcenie drugiego czynnika: $a^3 - b^3 = (a-b)((a+b)^2 - ab)$	2 pkt
	Rozwiązanie bezbłędne: stwierdzenie na podstawie założenia, że jeżeli liczby $(a+b)^2$ i $ab$ są podzielne przez $k$ , to ich różnica jest podzielna przez $k$ oraz $a-b$ jest liczbą całkowitą lub zapisanie: $a^3 - b^3 = (a-b)((a+b)^2 - ab) = (a-b)(k^2p^2 - kq) = k(a-b)(kp^2 - q)$ , gdzie $p$ i $q$ są liczbami całkowitymi oraz $a-b$ i $kp^2 - q$ są liczbami całkowitymi	3 pkt
5.	Postęp: zapisanie warunków: $\begin{cases} (1) x+1 > 0 \\ (2) \log_{\frac{1}{3}}(x+1) > 0 \\ (3) \log_2\left(\log_{\frac{1}{3}}(x+1)\right) \geq 0 \end{cases}$	1 pkt
	Pokonanie zasadniczych trudności: rozwiązanie jednego z warunków (2) lub (3) (2) $\log_{\frac{1}{3}}(x+1) > \log_{\frac{1}{3}}1 \Leftrightarrow 0 < x+1 < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 0$ (3) $\log_{\frac{1}{3}}(x+1) \geq 1 \Leftrightarrow 0 < x+1 \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow -1 < x \leq -\frac{2}{3}$	3 pkt (2 pkt, jeśli rozwiązano jeden warunek)
	Rozwiązanie bezbłędne: rozwiązanie układu wszystkich warunków $\begin{cases} x > -1 \\ -1 < x < 0 \\ -1 < x \leq -\frac{2}{3} \end{cases}$ i zapisanie: $D = \left(-1, -\frac{2}{3}\right)$	4 pkt




Matematyka. Poziom rozszerzony  
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Numer zadania	Modelowe etapy rozwiązywania zadania	Liczba punktów
6.	Istotny postępowanie: zapisanie: $b_{n+1} = 5^{a_{n+1}} = 5^{a_n+r} = 5^{a_n} \cdot 5^r = b_n \cdot 5^r$ , $n \in N_+$ i $5^r$ – liczba	2 pkt (1 pkt, jeśli niewyjaśniono, że $5^r$ jest liczbą)
	Pokonanie zasadniczych trudności: zapisanie: $b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \cdot \dots \cdot b_n = 5^{a_1+a_2+\dots+a_n}$	3 pkt
	Rozwiązanie prawie całkowite: zastosowanie wzorów na $n$ -tą sumę częściową	4 pkt
	Rozwiązanie bezbłędne: wyznaczenie $b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \cdot \dots \cdot b_n = 5^{\frac{3n^2-n}{2}}$	5 pkt
7.	Postępowanie: zapisanie alternatywy układów: $\begin{cases} \cos x \geq 0 \\ 2 \sin x \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} \cos x < 0 \\ -2 \sin x \cos x = \frac{1}{2} \end{cases}$	1 pkt
	Istotny postępowanie: zastosowanie wzoru na $\sin 2x$ $\begin{cases} \cos x \geq 0 \\ \sin 2x = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} \cos x < 0 \\ -\sin 2x = \frac{1}{2} \end{cases}$	2 pkt
	Pokonanie zasadniczych trudności: rozwiązanie równań dla $x \in (0, 2\pi)$ : $\sin 2x = \frac{1}{2}$ $x = \frac{\pi}{12} \text{ lub } x = \frac{5\pi}{12}, \text{ lub } x = \frac{13\pi}{12}, \text{ lub } x = \frac{17\pi}{12}$ $\sin 2x = -\frac{1}{2}$ $x = \frac{7\pi}{12} \text{ lub } x = \frac{11\pi}{12}, \text{ lub } x = \frac{19\pi}{12}, \text{ lub } x = \frac{23\pi}{12}$	3 pkt
	Rozwiązanie prawie całkowite: poprawne rozwiązanie każdego z układów: $\begin{cases} \cos x \geq 0 \\ x \in \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12} \right\} \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} \cos x < 0 \\ x \in \left\{ \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{19\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right\} \end{cases}$ $x \in \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12} \right\} \text{ lub } x \in \left\{ \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12} \right\}$	4 pkt
	Rozwiązanie bezbłędne: zapisanie rozwiązania $x \in \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{7\pi}{12}, \frac{11\pi}{12} \right\}$	5 pkt


Matematyka. Poziom rozszerzony  
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Numer zadania	Modelowe etapy rozwiązywania zadania	Liczba punktów
8.	<p>Postęp: wykonanie rysunku</p>  <p>lub opis oznaczeń:  <i>P</i> – punkt przecięcia prostej <i>k</i> z prostą <i>AB</i>  <i>M</i> – punkt styczności <i>o</i>(<i>A</i>, <i>r</i>) z prostą <i>k</i>  <i>N</i> – punkt styczności <i>o</i>(<i>B</i>, <i>R</i>) z prostą <i>k</i></p>	1 pkt
	<p>Istotny postęp: zastosowanie twierdzenia Talesa:  <math>\frac{ BN }{ BP } = \frac{ AM }{ AP }, \frac{R}{R+r+a} = \frac{r}{a}</math>, gdzie <math> AP =a</math></p>	2 pkt
	<p>Pokonanie zasadniczych trudności: wyznaczenie <math> AP =a = \frac{(R+r)r}{R-r}</math></p>	3 pkt
	<p>Rozwiązanie bezbłędne: wyznaczenie z trójkąta <i>AMP</i>: <math>\sin \alpha = \frac{r}{ AP } = \frac{R-r}{R+r}</math></p>	4 pkt
9.	<p>Postęp: oznaczenie wierzchołków trójkąta: <math>A = (x_A, y_A), B = (x_B, y_B), C = (x_C, y_C)</math> i wykorzystanie wzoru na współrzędne środka odcinka:  <math>K = \left(\frac{x_A+x_B}{2}, \frac{y_A+y_B}{2}\right), L = \left(\frac{x_B+x_C}{2}, \frac{y_B+y_C}{2}\right)</math> i <math>M = \left(\frac{x_A+x_C}{2}, \frac{y_A+y_C}{2}\right)</math></p>	1 pkt
	<p>Istotny postęp: zapisanie odpowiednich układów równań:  <math display="block">\begin{cases} \frac{x_A+x_B}{2} = 2 \\ \frac{x_B+x_C}{2} = -2 \\ \frac{x_A+x_C}{2} = -1 \end{cases} \text{ i } \begin{cases} \frac{y_A+y_B}{2} = 2 \\ \frac{y_B+y_C}{2} = 1 \\ \frac{y_A+y_C}{2} = -1 \end{cases}</math></p>	2 pkt
	<p>Pokonanie zasadniczych trudności: rozwiązanie układów równań i zapisanie współrzędnych punktów: <math>A = (3, 0), B = (1, 4), C = (-5, -2)</math></p>	3 pkt
	<p>Rozwiązanie bezbłędne: wyznaczenie obrazów punktów <i>A</i>, <i>B</i>, <i>C</i> symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych <math>A' = (-3, 0), B' = (-1, -4), C' = (5, 2)</math></p>	4 pkt

Matematyka. Poziom rozszerzony  
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Numer zadania	Modelowe etapy rozwiązywania zadania	Liczba punktów
10.	<p>Postęp: zastosowanie twierdzenia sinusów do trójkąta <math>ABC</math> i obliczenie <math>\sin(\sphericalangle ABC) = \frac{3}{5}</math></p>	1 pkt
	<p>Istotny postęp: obliczenie <math>\cos(\sphericalangle ABC) = \frac{4}{5}</math>, <math>\sphericalangle ABC</math> – kąt ostry</p>	2 pkt
	<p>Pokonanie zasadniczych trudności: zastosowanie twierdzenia cosinusów do trójkąta <math>ABK</math> <math> AK ^2 = 10^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 10 \cdot \frac{4}{5}</math></p>	3 pkt
	<p>Rozwiązanie bezbłędne: obliczenie <math> AK  = 6\sqrt{2}</math></p>	4 pkt
11.	<p>Postęp: obliczenie prawdopodobieństwa wylosowania z zielonego pudełka 5 zł oraz 2 zł <math>P(B_1) = \frac{2}{3}</math>      <math>P(B_2) = \frac{1}{3}</math></p>	1 pkt
	<p>Istotny postęp: obliczenie prawdopodobieństw przy losowaniu z białego pudełka <math>p_1 = \frac{\binom{3}{1}\binom{3}{1}}{\binom{6}{2}} = \frac{3}{5}</math>      <math>p_2 = \frac{\binom{2}{1}\binom{4}{1}}{\binom{6}{2}} = \frac{8}{15}</math></p>	2 pkt
	<p>Pokonanie zasadniczych trudności: narysowanie drzewka i podpisanie odpowiednich gałęzi</p> 	3 pkt
	<p>Rozwiązanie bezbłędne: obliczenie: <math>\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15} = \frac{26}{45}</math></p>	4 pkt

Matematyka. Poziom rozszerzony  
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetą Wyborczą”

Numer zadania	Modelowe etapy rozwiązywania zadania	Liczba punktów
12.	<p>Postęp: sporządzenie poprawnego rysunku z oznaczeniami: <math>OW</math> – wysokość bryły, <math>LW</math> – wysokość trójkąta powstałego w przekroju</p>  <p>lub opisanie oznaczeń bez rysunku i wyjaśnienie, że kąt <math>\alpha</math> jest wyznaczony przez wysokość przekroju i przekątną podstawy</p>	1 pkt
	<p>Istotny postęp: wyznaczenie długości odcinka <math>OL</math>: <math> OL  = \frac{a\sqrt{2}}{4}</math></p>	2 pkt
	<p>Pokonanie zasadniczych trudności: wyznaczenie z trójkąta <math>OLW</math> długości wysokości ostrosłupa: <math>H =  OW  = \frac{a\sqrt{2}}{4} \cdot \operatorname{tg} \alpha</math></p>	3 pkt
	<p>Rozwiązanie bezbłędne: wyznaczenie objętości ostrosłupa: <math>V = \frac{a^3 \sqrt{2}}{12} \operatorname{tg} \alpha</math></p>	4 pkt