

**PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY  
Z NOWĄ ERA 2016/2017**

**MATEMATYKA  
POZIOM ROZSZERZONY**

**ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ**

Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne i spełniające warunki zadania.

**Zadanie 1. (0–1)**

Wymagania ogólne	Wymagania szczegółowe	Poprawna odp. (1 p.)
II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	1.2. Liczby rzeczywiste. Zdający stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.	A

**Zadanie 2. (0–1)**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	5.1. Ciągi. Zdający wyznacza wyrazy ciągu określonego wzorem rekurencyjnym.	C
--	--	---

**Zadanie 3. (0–1)**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	3.6. Równania i nierówności. Zdający rozwiązuje równania wielomianowe dające się łatwo sprowadzić do równań kwadratowych.	B
--	--	---

**Zadanie 4. (0–1)**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	6.5. Trygonometria. Zdający stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów.	D
--	---	---

**Zadanie 5. (0–1)**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	8.4. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej. Zdający oblicza odległość punktu od prostej.	B
--	--	---

**Zadanie 6. (0–2)**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	2.1. Wyrażenia algebraiczne. Zdający używa wzorów skróconego mnożenia na $(a \pm b)^3$ oraz $a^3 \pm b^3$ .	180
--	--	-----

**Zadanie 7. (0–2)**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	5.2. Ciągi. Zdający oblicza granice ciągów korzystając z granic ciągów typu $\frac{1}{n}$ , $\frac{1}{n^2}$ oraz z twierdzeń o działaniach na granicach ciągów.
--	--

**Przykładowe rozwiązania**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)^2}{(2n-2)^2 + (6n+3)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2}{\left(2 - \frac{2}{n}\right)^2 + \left(6 + \frac{3}{n}\right)^2} = \frac{1}{4 + 36} = \frac{1}{40} = 0,025$$

lub

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)^2}{(2n-2)^2 + (6n+3)^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2n + 1}{4n^2 - 8n + 4 + 36n^2 + 36n + 9} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2n + 1}{40n^2 + 28n + 13} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{40 + \frac{28}{n} + \frac{13}{n^2}} = \frac{1}{40} = 0,025 \end{aligned}$$

**Schemat punktowania**

Zdający otrzymuje ..... **1 pkt**

gdy zapisze  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)^2}{(2n-2)^2 + (6n+3)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^2}{\left(2 - \frac{2}{n}\right)^2 + \left(6 + \frac{3}{n}\right)^2}$

albo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}{40 + \frac{28}{n} + \frac{13}{n^2}}$$

Zdający otrzymuje ..... **2 pkt**

gdy obliczy granicę  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)^2}{(2n-2)^2 + (6n+3)^2} = \frac{1}{40} = 0,025$ .

**Zadanie 8. (0–2)**

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	4.1. Funkcje. Zdający na podstawie wykresu funkcji $y = f(x)$ szkicuje wykresy funkcji $y =  f(x) $ , $y = c \cdot f(x)$ , $y = f(cx)$ . POZIOM PODSTAWOWY 4.10. Funkcje. Zdający interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej.
--	---

**Przykładowe rozwiązania**

**I sposób**

Funkcja kwadratowa  $f(x) = x^2 - 120$  przyjmuje najmniejszą wartość równą  $-120$  dla  $x = 0$ . Przesunięcie wykresu funkcji  $f$  wzdłuż osi  $Ox$  o 4 jednostki w lewo nie zmienia zbioru wartości funkcji. Największa wartość funkcji  $y = -2 \cdot f(x + 4)$  jest równa 240. Następnie przesuwamy wykres o 6 jednostek w dół, więc największa wartość funkcji  $g(x) = -2 \cdot f(x + 4) - 6$  to 234.

### Schemat punktowania I sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 1 pkt

• gdy zapisze, że największa wartość funkcji  $y = -2 \cdot f(x + 4)$  jest równa 240  
albo

• gdy zapisze, że najmniejsza wartość funkcji  $y = 2 \cdot f(x + 4)$  jest równa  $-240$ .

Zdający otrzymuje ..... 2 pkt

gdy zapisze, że największa wartość funkcji  $g(x) = -2 \cdot f(x + 4) - 6$  to 234.

### II sposób

Wyznaczamy wzór funkcji  $g$  i korzystamy ze wzoru na największą wartość trójmianu kwadratowego.

Mamy zatem:

$$g(x) = -2x^2 - 16x + 202$$

oraz

$$y_{\max} = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{[(-16)^2 + 8 \cdot 202]}{4 \cdot (-2)} = \frac{1872}{8} = 234.$$

### Schemat punktowania II sposobu rozwiązania

Zdający otrzymuje ..... 1 pkt

gdy zapisze wzór funkcji  $g$  w postaci  $g(x) = -2x^2 - 16x + 202$  i obliczy wyróżnik trójmianu kwadratowego  $\Delta = 1872$ .

Zdający otrzymuje ..... 2 pkt

gdy zapisze, że największa wartość funkcji  $g(x) = -2 \cdot f(x + 4) - 6$  to 234.

### Zadanie 9. (0–2)

II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.	5.3. Ciągi. Zdający rozpoznaje szeregi geometryczne zbieżne i oblicza ich sumy.
--	--

### Przykładowe rozwiązanie

Iloraz  $q$  ciągu geometrycznego  $(a_n)$  jest równy  $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{k-1}{k} = 1 - \frac{1}{k}$ .

Ponieważ  $k > 1$ , co wynika z założenia, więc  $|q| < 1$ . To znaczy, że istnieje skończona suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego  $(a_n)$  i jest równa  $S = \frac{k}{1 - \left(1 - \frac{1}{k}\right)} = k^2$ .

Otrzymujemy równanie  $k^2 = 5$ , którego jedynym rozwiązaniem większym od 1 jest liczba  $\sqrt{5}$ .

**Schemat punktowania**

**Zdający otrzymuje** ..... **1 pkt**

gdy sprawdzi, że  $|q| < 1$  dla  $k > 1$  i zapisze, że suma wszystkich wyrazów ciągu jest równa  $S = \frac{k}{1 - (1 - \frac{1}{k})}$ .

**Zdający otrzymuje** ..... **2 pkt**

gdy zdający poda rozwiązanie  $k = \sqrt{5}$ .

**Zadanie 10. (0–4)**

IV. Użycie i tworzenie strategii.	6. Trygonometria. Zdający: 5) stosuje wzory na sinus i cosinus sumy i różnicy kątów, sumę i różnicę sinusów i cosinusów kątów; 6) rozwiązuje równania i nierówności trygonometryczne typu $\sin 2x = \frac{1}{2}$ , $\sin 2x + \cos x = 1$ , $\sin x + \cos x = 1$ , $\cos 2x < \frac{1}{2}$ .
-----------------------------------	--

**Przykładowe rozwiązania**

**I sposób**

Zauważmy, że  $2 \cos 2x \cos 5x = \cos 7x + \cos 3x$ . Zatem równanie możemy zapisać w postaci równoważnej  $\cos 7x + \cos 3x = \cos 7x + \frac{1}{2}$ , czyli  $\cos 3x = \frac{1}{2}$ .

Stąd otrzymujemy

$3x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$  lub  $3x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą, czyli

$x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi$  lub  $x = \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą.

Zatem w przedziale  $\langle 0, \pi \rangle$  mamy następujące rozwiązania tego równania:  $x = \frac{\pi}{9}$ ,  $x = \frac{5\pi}{9}$ ,  $x = \frac{7\pi}{9}$ .

**Schemat punktowania I sposobu rozwiązania**

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... **1 pkt**

Zdający zapisze, że  $2 \cos 2x \cos 5x = \cos 7x + \cos 3x$  i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... **2 pkt**

Zdający zapisze równanie w postaci równoważnej  $\cos 3x = \frac{1}{2}$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... **3 pkt**

Zdający zapisze wszystkie rozwiązania równania  $\cos 3x = \frac{1}{2}$  w zbiorze liczb rzeczywistych:  $x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi$  lub  $x = \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą.

**Rozwiązanie pełne** ..... **4 pkt**

Zdający zapisze wszystkie rozwiązania równania  $\cos 3x = \frac{1}{2}$  w przedziale  $\langle 0, \pi \rangle$ :  $x = \frac{\pi}{9}$ ,  $x = \frac{5\pi}{9}$ ,  $x = \frac{7\pi}{9}$ .

## II sposób

Zauważmy, że  $\cos 7x = \cos(5x + 2x) = \cos 5x \cos 2x - \sin 5x \sin 2x$ . Zatem równanie możemy zapisać w postaci równoważnej

$$2 \cos 2x \cos 5x = \cos 5x \cos 2x - \sin 5x \sin 2x + \frac{1}{2}.$$

Stąd

$$\cos 5x \cos 2x + \sin 5x \sin 2x = \frac{1}{2}.$$

Ze wzoru na cosinus różnicy kątów otrzymujemy

$$\cos(5x - 2x) = \frac{1}{2},$$

czyli

$$\cos 3x = \frac{1}{2}.$$

Stąd otrzymujemy

$$3x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ lub } 3x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \text{ gdzie } k \text{ jest liczbą całkowitą,}$$

czyli

$$x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi \text{ lub } x = \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi, \text{ gdzie } k \text{ jest liczbą całkowitą.}$$

Zatem w przedziale  $\langle 0, \pi \rangle$  mamy następujące rozwiązania tego równania:  $x = \frac{\pi}{9}, x = \frac{5\pi}{9}, x = \frac{7\pi}{9}$ .

### Schemat punktowania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego**

**rozwiązania** ..... 1 pkt

Zdający zapisze równanie w postaci  $\cos 5x \cos 2x + \sin 5x \sin 2x = \frac{1}{2}$  i na tym poprzestanie lub dalej popełnia błędy.

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 2 pkt

Zdający zapisze równanie w postaci równoważnej  $\cos 3x = \frac{1}{2}$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 3 pkt

Zdający zapisze wszystkie rozwiązania równania  $\cos 3x = \frac{1}{2}$  w zbiorze liczb rzeczywistych:  $x = -\frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi$  lub  $x = \frac{\pi}{9} + \frac{2}{3}k\pi$ , gdzie  $k$  jest liczbą całkowitą.

**Rozwiązanie pełne** ..... 4 pkt

Zdający zapisze wszystkie rozwiązania równania  $\cos 3x = \frac{1}{2}$  w przedziale  $\langle 0, \pi \rangle$ :  $x = \frac{\pi}{9}, x = \frac{5\pi}{9}, x = \frac{7\pi}{9}$ .

### Zadanie 11. (0–4)

IV. Użycie i tworzenie strategii.	3.2. Równania i nierówności. Zdający rozwiązuje równania i nierówności liniowe i kwadratowe z parametrem.
-----------------------------------	--

### Przykładowe rozwiązanie

#### I sposób

Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego:

$$\Delta = (-(4m + 2))^2 - 4 \cdot 1 \cdot (4m^2 + 4m - 3) = 16m^2 + 16m + 4 - 16m^2 - 16m + 12 = 16 > 0$$

Zatem dla każdej wartości parametru  $m$  funkcja  $f$  ma dwa różne miejsca zerowe:

$$x_1 = \frac{-(-(4m+2)) - 4}{2 \cdot 1} = \frac{4m-2}{2} = 2m-1, \quad x_2 = \frac{-(-(4m+2)) + 4}{2 \cdot 1} = \frac{4m+6}{2} = 2m+3.$$

Warunek  $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$  możemy więc zapisać w następujący sposób:

$$\begin{aligned}(2m-1) + (2m+3) &= |(2m-1) - (2m+3)|, \text{ przy czym } x_1 + x_2 \geq 0, \text{ czyli } m \geq -\frac{1}{2} \\ 4m+2 &= |2m-1-2m-3|, \\ 4m+2 &= |-4|, \\ 4m+2 &= 4, \\ m &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

### Uwaga

Miejsca zerowe funkcji kwadratowej  $f(x) = x^2 - (4m+2)x + 4m^2 + 4m - 3$  możemy też wyznaczyć, przekształcając ją do postaci iloczynowej:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 - 2(2m+1)x + (2m+1)^2 - 4, \\ f(x) &= (x - (2m+1))^2 - 4, \\ f(x) &= (x - 2m - 1 - 2)(x - 2m - 1 + 2), \\ f(x) &= (x - 2m - 3)(x - 2m + 1), \text{ więc} \\ x_1 &= 2m+3, \quad x_2 = 2m-1.\end{aligned}$$

### Schemat punktowania I sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym postępowanie jest niewielkie, ale konieczne na drodze do pełnego rozwiązania** ..... 1 pkt

Zdający obliczy wyróżnik trójmianu kwadratowego i stwierdzi, że dla każdej wartości parametru  $m$  istnieją dwa różne miejsca zerowe funkcji  $f$ .

**Rozwiązanie, w którym jest istotnym postępowaniem** ..... 2 pkt

Zdający wyznaczy miejsca zerowe w zależności od parametru  $m$ :  $x = 2m+3$ ,  $x = 2m-1$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności** ..... 3 pkt

Zdający zapisze warunek  $2m+3+2m-1 = |2m+3-(2m-1)|$

lub  $2m+3+2m-1 = |2m-1-(2m+3)|$

**Rozwiązanie pełne** ..... 4 pkt

Zdający rozwiąże równanie i zapisze wynik  $m = \frac{1}{2}$ .

### II sposób

Funkcja kwadratowa  $f$  ma dwa różne miejsca zerowe wtedy i tylko wtedy, gdy wyróżnik trójmianu  $x^2 - (4m+2)x + 4m^2 + 4m - 3$  jest dodatni. Sprawdzamy, dla jakich wartości parametru  $m$  spełniona jest nierówność  $\Delta > 0$ :

$$\begin{aligned}(-(4m+2))^2 - 4 \cdot 1 \cdot (4m^2 + 4m - 3) &> 0, \\ 16m^2 + 16m + 4 - 16m^2 - 16m + 12 &> 0, \\ 16 &> 0,\end{aligned}$$

co jest prawdą dla każdej rzeczywistej wartości parametru  $m$ .

Zapiszemy teraz warunek  $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$ , korzystając z wzorów Viète'a:

$$-\frac{(4m+2)}{1} = |x_1 - x_2|.$$

Ponieważ  $|x_1 - x_2| \geq 0$ , więc aby zachodziła równość, musi być spełniony warunek:

$$-\frac{-(4m+2)}{1} \geq 0,$$

czyli  $4m + 2 \geq 0$ .

Zatem  $m \geq -\frac{1}{2}$ .

Ponieważ dla  $m \geq -\frac{1}{2}$  prawdziwa jest nierówność  $x_1 + x_2 \geq 0$ , więc można bez utraty równoważności podnieść obie strony równania  $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$  do kwadratu:

$$\begin{aligned}(x_1 + x_2)^2 &= (x_1 - x_2)^2, \\ x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 &= x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2, \\ 4x_1x_2 &= 0, \\ x_1x_2 &= 0.\end{aligned}$$

Ze wzorów Viète'a otrzymujemy:

$$\begin{aligned}\frac{4m^2 + 4m - 3}{1} &= 0, \\ 4m^2 + 4m - 3 &= 0, \\ 4m^2 + 4m + 1 - 4 &= 0, \\ (2m + 1)^2 - 4 &= 0, \\ (2m + 1 - 2)(2m + 1 + 2) &= 0, \\ (2m - 1)(2m + 3) &= 0, \\ 2m - 1 = 0 \text{ lub } 2m + 3 = 0, \\ m = \frac{1}{2} \text{ lub } m = -\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Tylko pierwsza z tych liczb spełnia warunek  $m \geq -\frac{1}{2}$ . Zatem tylko dla  $m = \frac{1}{2}$  spełnione są warunki zadania.

### Schemat punktowania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... 1 pkt

Zdający obliczy wyróżnik trójmianu kwadratowego i stwierdzi, że dla każdej wartości parametru  $m$  istnieją dwa różne miejsca zerowe funkcji  $f$ .

**Rozwiązanie, w którym jest istotnym postęp** ..... 2 pkt

Zdający zapisze warunek  $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$  w postaci równoważnej:  $x_1 + x_2 \geq 0$  i  $(x_1 + x_2)^2 = (x_1 - x_2)^2$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności** ..... 3 pkt

Zdający

- skorzysta dwukrotnie ze wzorów Viète'a, zapisze nierówność  $-\frac{-(4m+2)}{1} \geq 0$  oraz równanie  $\frac{4m^2 + 4m - 3}{1} = 0$ , a następnie każde z nich rozwiąże (nierówność:  $m \geq -\frac{1}{2}$ , równanie:  $m = \frac{1}{2}$  lub  $m = -\frac{3}{2}$ ).

albo

- skorzysta dwukrotnie ze wzorów Viète'a, zapisze nierówność  $-\frac{-(4m+2)}{1} \geq 0$  oraz równanie  $\frac{4m^2 + 4m - 3}{1} = 0$ , a następnie napisze, że rozwiązaniem jest część wspólna rozwiązania nierówności i rozwiązania równania.



**Rozwiązanie pełne** ..... 4 pkt

Zdający poda wynik  $m = \frac{1}{2}$ .

### III sposób

Przypuśćmy, że istnieje taka wartość parametru  $m$ , dla której funkcja

$f(x) = x^2 - (4m + 2)x + 4m^2 + 4m - 3$  ma dwa różne miejsca zerowe  $x_1, x_2$  spełniające warunek  $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$ .

Po podniesieniu obu stron tej równości do kwadratu otrzymujemy:

$$\begin{aligned}(x_1 + x_2)^2 &= (x_1 - x_2)^2, \\ x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 &= x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2, \\ 4x_1x_2 &= 0, \\ x_1x_2 &= 0.\end{aligned}$$

Ze wzorów Viète'a otrzymujemy:

$$\begin{aligned}\frac{4m^2 + 4m - 3}{1} &= 0, \\ 4m^2 + 4m - 3 &= 0, \\ 4m^2 + 4m + 1 - 4 &= 0, \\ (2m + 1)^2 - 4 &= 0, \\ (2m + 1 - 2)(2m + 1 + 2) &= 0, \\ (2m - 1)(2m + 3) &= 0, \\ 2m - 1 = 0 \text{ lub } 2m + 3 = 0, \\ m = \frac{1}{2} \text{ lub } m = -\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Pozostaje teraz tylko sprawdzić, czy dla wyznaczonych wartości parametru  $m$  spełnione są warunki zadania.

Gdy  $m = \frac{1}{2}$ , to:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 - \left(4 \cdot \frac{1}{2} + 2\right)x + 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 4 \cdot \frac{1}{2} - 3, \text{ więc} \\ f(x) &= x(x - 4).\end{aligned}$$

Zatem istnieją dwa różne miejsca zerowe:  $x_1 = 0, x_2 = 4$ . Spełniają one warunek  $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$ , gdyż  $0 + 4 = |0 - 4|$ .

Gdy  $m = -\frac{3}{2}$ , to:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 - \left(4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) + 2\right)x + 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 4 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) - 3, \text{ więc} \\ f(x) &= x(x + 4).\end{aligned}$$

Zatem funkcja  $f$  ma dwa różne miejsca zerowe:  $x_1 = 0, x_2 = -4$ . Nie spełniają one jednak warunku  $x_1 + x_2 = |x_1 - x_2|$ , gdyż  $0 + (-4) = -4 \neq |0 - (-4)| = 4$ .

Zatem jest tylko jedna wartość parametru,  $m = \frac{1}{2}$ , dla której spełnione są warunki zadania.

### Schemat punktowania III sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... 1 pkt

Zdający stwierdzi, że jednym z miejsc zerowych funkcji  $f$  jest 0.

**Rozwiązanie, w którym jest istotnym postęp** ..... 2 pkt

Zdający zapisze równanie wynikające ze wzoru Viète'a na  $x_1 \cdot x_2$ :  $\frac{4m^2 + 4m - 3}{1} = 0$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 3 pkt

Zdający rozwiąże równanie  $\frac{4m^2 + 4m - 3}{1} = 0$  ( $m = \frac{1}{2}$  lub  $m = -\frac{3}{2}$ ).

**Rozwiązanie pełne** ..... 4 pkt

Zdający sprawdzi oba przypadki rozwiązania równania i wyciągnie poprawne wnioski, że  $m = \frac{1}{2}$  spełnia warunek podany w zadaniu, a  $m = -\frac{3}{2}$  nie spełnia tego warunku.

**Zadanie 12. (0–3)**

V. Rozumowanie i argumentacja.	POZIOM PODSTAWOWY 2.1. Wyrażenia algebraiczne. Zdający używa wzorów skróconego mnożenia na $(a \pm b)^2$ oraz $a^2 - b^2$ (przeprowadza dowód algebraiczny).
--------------------------------	--

**Przykładowe rozwiązania**

**I sposób**

Przekształcając nierówność w sposób równoważny, otrzymujemy:

$$x^2 + 2xy + y^2 + x^2 + 2xz + z^2 + y^2 + 2zy + z^2 + x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz \geq 0,$$

$$(x + y)^2 + (x + z)^2 + (y + z)^2 + (x + y)^2 + 2(x + y)z + z^2 \geq 0,$$

$$(x + y)^2 + (x + z)^2 + (y + z)^2 + (x + y + z)^2 \geq 0.$$

Ta nierówność jest prawdziwa, ponieważ jej lewa strona jest sumą czterech liczb nieujemnych, więc jest nieujemna.

**Schemat punktowania I sposobu rozwiązania**

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 1 pkt

Zdający zapisze nierówność w postaci

- $x^2 + 2xy + y^2 + x^2 + 2xz + z^2 + y^2 + 2zy + z^2 + x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz \geq 0$

albo

- $(x + y)^2 + (x + z)^2 + (y + z)^2 + x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz \geq 0$

albo

- $(x + y)^2 + (x + z)^2 + (y + z)^2 + (x + y)^2 + 2(x + y)z + z^2 \geq 0.$

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 2 pkt

Zdający zapisze nierówność w postaci

$$(x + y)^2 + (x + z)^2 + (y + z)^2 + (x + y + z)^2 \geq 0.$$

**Rozwiązanie pełne** ..... 3 pkt

Zdający przeprowadzi pełne rozumowanie.

**II sposób**

Nierówność możemy zapisać w postaci równoważnej

$$3x^2 + 4(y + z)x + 3y^2 + 3z^2 + 4yz \geq 0.$$

Możemy ją potraktować jak nierówność kwadratową z jedną niewiadomą  $x$ .

Ponieważ współczynnik przy  $x^2$  jest dodatni, więc wystarczy wykazać, że wyróżnik trójmianu stojącego po lewej stronie nierówności jest niedodatni.

$$\begin{aligned}\Delta_x &= 16(y+z)^2 - 12(3y^2 + 3z^2 + 4yz) = -4(5y^2 + 4yz + 5z^2) = \\ &= -4(3y^2 + 2y^2 + 4yz + 2z^2 + 3z^2) = -4(3y^2 + 2(y+z)^2 + 3z^2) \leq 0,\end{aligned}$$

gdź  $3y^2 + 2(y+z)^2 + 3z^2 \geq 0$  dla dowolnych liczb rzeczywistych  $y, z$ .

### Uwaga

Prawdziwość nierówności  $\Delta_x \leq 0$ , czyli  $-4(5y^2 + 4yz + 5z^2) \leq 0$ , a więc  $5y^2 + 4yz + 5z^2 \geq 0$ , możemy wykazać też w inny sposób, np. zapisując ją w postaci równoważnej  $(2y+z)^2 + y^2 + 4z^2 \geq 0$ , której prawdziwość jest oczywista. Możemy też potraktować tę nierówność jak nierówność kwadratową z niewiadomą  $y$ . Wówczas  $\Delta_y = (4z)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 5z^2 = -84z^2 \leq 0$  dla każdej liczby rzeczywistej  $z$ . To, wraz z dodatnim znakiem współczynnika przy  $y^2$ , oznacza prawdziwość tej nierówności.

### Schemat punktowania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 1 pkt

Zdający uporządkuje wyrażenie jako trójmian kwadratowy np. zmiennej  $x$ :

$3x^2 + 4(y+z)x + 3y^2 + 3z^2 + 4yz \geq 0$  i obliczy wyróżnik tego trójmianu:  $\Delta_x = -4(5y^2 + 4yz + 5z^2)$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 2 pkt

Zdający uzasadni, że nierówność  $-4(5y^2 + 4yz + 5z^2) \leq 0$  jest prawdziwa dla każdej liczby rzeczywistej  $y$  i każdej liczby rzeczywistej  $z$  poprzez

- zapisanie jej w postaci równoważnej  $(2y+z)^2 + y^2 + 4z^2 \geq 0$

albo

- obliczenie wyróżnika  $\Delta_y = (4z)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 5z^2 = -84z^2$  trójmianu  $5y^2 + 4yz + 5z^2$  i stwierdzenie, że jest on niedodatni dla każdej liczby rzeczywistej  $z$ .

**Rozwiązanie pełne** ..... 3 pkt

Zdający przeprowadzi pełne rozumowanie.

### Zadanie 13. (0–4)

III. Modelowanie matematyczne.	10.2. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka. Zdający oblicza prawdopodobieństwo warunkowe.
--------------------------------	---

### Przykładowe rozwiązanie

$A$  – zdarzenie polega na tym, że suma wyrzuconych oczek na wszystkich kostkach będzie parzysta

$B$  – zdarzenie polega na tym, że dokładnie na jednej kostce wypadnie 6 oczek

Z definicji prawdopodobieństwa warunkowego

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{|A \cap B|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{|A \cap B|}{|B|}.$$

Wystarczy więc obliczyć tylko  $|A \cap B|$  oraz  $|B|$ .

Obliczmy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu  $B$ .

Sześć oczek mogło wypaść na pierwszej, drugiej albo na trzeciej kostce, a na pozostałych dowolna liczba oczek oprócz sześciu. Mamy zatem:  $|B| = 3 \cdot 5 \cdot 5 = 75$  możliwości.

Obliczmy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych sprzyjających zdarzeniu  $A \cap B$ .

Na dokładnie jednej kostce wypadło sześć oczek, więc na dwóch pozostałych muszą wypaść dwie parzyste (różne od sześciu) albo dwie nieparzyste liczby oczek.

W pierwszym przypadku mamy  $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$  możliwości, a w drugim  $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ .

Więc  $|A \cap B| = 12 + 27 = 39$ .

Zatem  $P(A | B) = \frac{39}{75} = \frac{13}{25}$ .

### Schemat punktowania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... 1 pkt

Zdający

- obliczy liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych:  $|\Omega| = 6^3$   
albo
- opíše obie sytuacje, w których na jednej kostce wypadnie 6 oczek i suma oczek będzie parzysta.

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 2 pkt

Zdający obliczy

- prawdopodobieństwo zdarzenia  $A \cap B$  lub tylko  $|A \cap B|$   
albo
- prawdopodobieństwo zdarzenia  $B$  lub tylko  $|B|$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 3 pkt

Zdający obliczy prawdopodobieństwo zdarzenia  $A \cap B$  (lub tylko  $|A \cap B|$ ) oraz prawdopodobieństwo zdarzenia  $B$  (lub tylko  $|B|$ ).

**Rozwiązanie pełne** ..... 4 pkt


Zdający obliczy prawdopodobieństwo warunkowe  $P(A | B)$ :  $P(A | B) = \frac{39}{75} = \frac{13}{25}$ .

### Zadanie 14. (0–4)

V. Rozumowanie i argumentacja.	7. Planimetria. Zdający: 1) stosuje twierdzenia charakteryzujące czworokąty wpisane w okrąg i czworokąty opisane na okręgu; 5) znajduje związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem twierdzenia sinusów i twierdzenia cosinusów.
--------------------------------	--

### Przykładowe rozwiązanie

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku.



Ponieważ czworokąt  $ABCD$  jest wpisany w okrąg, to  $\beta = 180^\circ - \delta$ . Z twierdzenia cosinusów dla trójkątów  $ACD$  i  $ABC$  otrzymujemy

$$p^2 = 7^2 + 15^2 - 2 \cdot 7 \cdot 15 \cdot \cos \delta \text{ oraz } p^2 = 24^2 + 20^2 - 2 \cdot 24 \cdot 20 \cdot \cos(180^\circ - \delta).$$

Drugą z tych równości możemy zapisać, korzystając ze wzoru redukcyjnego, w postaci

$$p^2 = 24^2 + 20^2 + 2 \cdot 24 \cdot 20 \cdot \cos \delta.$$

Po pomnożeniu obu stron pierwszego równania przez 32, drugiego równania przez 7 i dodaniu stronami otrzymanych równań, otrzymujemy równanie

$$39p^2 = 15\,600.$$

Stąd  $p = 20$ .

### Schemat punktowania

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 1 pkt

Zdający wykorzysta twierdzenie o sumie przeciwległych kątów czworokąta wpisanego w okrąg.

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 2 pkt

Zdający zapisze dwa równania wynikające z twierdzenia cosinusów dla trójkątów  $ABC$  i  $ACD$ :

$$p^2 = 7^2 + 15^2 - 2 \cdot 7 \cdot 15 \cdot \cos \delta \text{ oraz } p^2 = 24^2 + 20^2 - 2 \cdot 24 \cdot 20 \cdot \cos(180^\circ - \delta).$$

**Rozwiązanie prawie pełne** ..... 3 pkt

Zdający zapisze równanie, w którym jedyną niewiadomą jest długość przekątnej  $AC$ .

**Rozwiązanie pełne** ..... 4 pkt

Zdający wyznaczy długość przekątnej  $AC$ :  $p = 20$ .


### Zadanie 15. (0–5)

IV. Użycie i tworzenie strategii.	POZIOM PODSTAWOWY 8.5. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej. Zdający wyznacza współrzędne środka odcinka.
-----------------------------------	---

### Przykładowe rozwiązania

#### I sposób

Obliczmy współrzędne środka  $P$  odcinka  $MN$ :  $P = \left( \frac{8+10}{2}, \frac{1+5}{2} \right) = (9, 3)$ .



Oznaczmy współrzędne punktu  $C = (x_C, y_C)$ . Punkt  $S$  jest środkiem odcinka  $AC$ , więc  $S = \left(\frac{x_C}{2}, \frac{y_C}{2}\right)$ .

Punkt  $P$  jest środkiem odcinka  $SC$ , więc  $\frac{x_C + \frac{x_C}{2}}{2} = 9$  oraz  $\frac{y_C + \frac{y_C}{2}}{2} = 3$ .

Stąd  $C = (12, 4)$ .

Punkt  $N$  jest środkiem odcinka  $CD$ , więc  $\frac{x_D + 12}{2} = 10$  oraz  $\frac{y_D + 4}{2} = 5$ . Stąd  $D = (8, 6)$ .

Punkt  $M$  jest środkiem odcinka  $CB$ , więc  $\frac{x_B + 12}{2} = 8$  oraz  $\frac{y_B + 4}{2} = 1$ . Stąd  $B = (4, -2)$ .

### Schemat punktowania I sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... 1 pkt

Zdający

- zapisze, że środek  $P$  odcinka  $MN$  jest środkiem odcinka  $SC$ , gdzie  $S$  jest środkiem symetrii równoległoboku  $ABCD$

albo

- obliczy współrzędne środka  $P$  odcinka  $MN$ :  $P = (9, 3)$ .

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 2 pkt

Zdający zapisze, że środek  $P$  odcinka  $MN$  jest środkiem odcinka  $SC$ , gdzie  $S$  jest środkiem symetrii równoległoboku  $ABCD$ , oraz obliczy współrzędne środka  $P$  odcinka  $MN$ :  $P = (9, 3)$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 3 pkt

Zdający obliczy współrzędne wierzchołka  $C$ :  $C = (12, 4)$ .

**Rozwiązanie prawie pełne** ..... 4 pkt

Zdający obliczy

- współrzędne wierzchołków  $B$ ,  $C$  i  $D$ , popełniając w trakcie rozwiązania błąd rachunkowy

albo

- dwa z trzech szukanych wierzchołków równoległoboku.

**Rozwiązanie pełne** ..... 5 pkt

Zdający obliczy współrzędne wierzchołków  $B$ ,  $C$ ,  $D$ :  $B = (4, -2)$ ,  $C = (12, 4)$ ,  $D = (8, 6)$ .

### II sposób

Współrzędne punktów  $B$ ,  $C$  i  $D$  możemy wyznaczyć, rozwiązując układ równań:

$$\begin{cases} \frac{x_B + x_C}{2} = 8 \\ \frac{x_C + x_D}{2} = 10 \\ x_B + x_D = x_C \\ \frac{y_B + y_C}{2} = 1 \\ \frac{y_C + y_D}{2} = 5 \\ y_B + y_D = y_C \end{cases}$$

Rozwiązaniem tego układu są:

$$x_B = 4$$

$$x_C = 12$$

$$x_D = 8$$

$$y_B = -2$$

$$y_C = 4$$

$$y_D = 6$$

### Schemat punktowania II sposobu rozwiązania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... 1 pkt

Zdający zapisze

- równanie  $\frac{x_B + x_C}{2} = 8$  lub  $\frac{x_C + x_D}{2} = 10$  lub  $\frac{y_B + y_C}{2} = 1$  lub  $\frac{y_C + y_D}{2} = 5$ , czyli wykorzysta fakt, że punkty  $M$  i  $N$  są środkami odcinków  $BC$  i  $CD$

albo

- zapisze równanie  $x_B + x_D = x_C$  lub  $y_B + y_D = y_C$ , czyli wykorzysta fakt, że  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 2 pkt

Zdający zapisze równanie  $\frac{x_B + x_C}{2} = 8$  lub  $\frac{x_C + x_D}{2} = 10$  lub  $\frac{y_B + y_C}{2} = 1$  lub  $\frac{y_C + y_D}{2} = 5$ , czyli wykorzysta fakt, że punkty  $M$  i  $N$  są środkami odcinków  $BC$  i  $CD$ , oraz zapisze równanie  $x_B + x_D = x_C$  lub  $y_B + y_D = y_C$ , czyli wykorzysta fakt, że  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 3 pkt

Zdający zapisze wszystkie równania potrzebne do wyznaczenia współrzędnych

$$\text{punktów } B, C \text{ i } D, \text{ np. } \begin{cases} \frac{x_B + x_C}{2} = 8 \\ \frac{x_C + x_D}{2} = 10 \\ x_B + x_D = x_C \\ \frac{y_B + y_C}{2} = 1 \\ \frac{y_C + y_D}{2} = 5 \\ y_B + y_D = y_C \end{cases}$$

**Rozwiązanie prawie pełne** ..... 4 pkt

Zdający obliczy współrzędne wierzchołków  $B$ ,  $C$  i  $D$ , popełniając w trakcie rozwiązania błąd rachunkowy.

**Rozwiązanie pełne** ..... 5 pkt


Zdający obliczy współrzędne wierzchołków  $B$ ,  $C$ ,  $D$ :  $B = (4, -2)$ ,  $C = (12, 4)$ ,  $D = (8, 6)$ .

**Zadanie 16. (0–6)**

IV. Użycie i tworzenie strategii.	7.4. Planimetria. Zdający rozpoznaje figury podobne; wykorzystuje (także w kontekstach praktycznych) ich własności. 9.2. Stereometria. Zdający określa, jaką figurą jest dany przekrój graniastoslupa lub ostrosłupa płaszczyzną.
-----------------------------------	--

**Przykładowe rozwiązanie**

Poprowadźmy prostą  $XY$  do przecięcia z prostymi  $AD$  i  $CD$  odpowiednio w punktach  $K$  i  $L$ .



Punkt  $W$  jest punktem przecięcia prostej  $KH$  z krawędzią  $AE$ , a  $Z$  to punkt przecięcia prostej  $HL$  z krawędzią  $CG$ .

Obliczmy długości kolejnych boków pięciokąta  $HWXYZ$ .

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta  $XBY$  otrzymujemy

$$|XY| = \sqrt{|BX|^2 + |BY|^2} = \sqrt{8^2 + 8^2} = 8\sqrt{2}.$$

Trójkąty  $XBY$  i  $XAK$  są podobne (oba są prostokątne i mają równe kąty przy wierzchołku  $X$ ). Stąd wynika, że

$$\frac{|BY|}{|AK|} = \frac{|BX|}{|AX|} = \frac{8}{8}.$$

Zatem  $|AK| = 4$ .

Trójkąty prostokątne  $KAW$  i  $KDH$  są podobne, więc

$$\frac{4}{16} = \frac{|AW|}{12}.$$

Stąd  $|AW| = 3$ .

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta  $AXW$  otrzymujemy

$$|WX| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5,$$

natomiast z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta  $WEH$

$$|WH| = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15.$$

Obwód pięciokąta  $HWXYZ$  jest zatem równy

$$L_{HWXYZ} = |XY| + 2 \cdot |XW| + 2 \cdot |WH| = 8\sqrt{2} + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 15 = 8\sqrt{2} + 40.$$



### Schemat punktowania

**Rozwiązanie, w którym postęp jest niewielki, ale konieczny na drodze do pełnego rozwiązania** ..... 1 pkt

Zdający

- dorysuje prostą  $XY$  do punktu przecięcia z prostą  $AD$  lub prostą  $CD$

albo

- obliczy lub poda długość odcinka  $|XY| = 8\sqrt{2}$ .

**Rozwiązanie, w którym jest istotny postęp** ..... 2 pkt

Zdający obliczy długość odcinka  $AK$  lub  $CL$  oraz zapisze lub zaznaczy na rysunku, że punkty  $K, W, H$  albo  $L, Z, H$  są współliniowe.

**Pokonanie zasadniczych trudności zadania** ..... 3 pkt

Zdający obliczy długość odcinka  $AW$ :  $|AW| = 3$ .

**Rozwiązanie prawie pełne** ..... 5 pkt

Zdający obliczy długości odcinków  $WH$  i  $WX$ :  $|WH| = 15$  oraz  $|WX| = 5$ .

*Uwaga*

Jeżeli zdający obliczy długość tylko jednego z odcinków,  $WH$  lub  $WX$ , to otrzymuje **4 punkty**.

**Rozwiązanie pełne** ..... 6 pkt

Zdający obliczy obwód szukanego przekroju:  $L_{HWXYZ} = 8\sqrt{2} + 40$ .

### Zadanie 17. (0–7)

III. Modelowanie matematyczne.	11.6. Rachunek różniczkowy. Zdający stosuje pochodne do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych.
--------------------------------	---

#### Przykładowe rozwiązanie

Niech  $x$  oznacza długość krótszej krawędzi podstawy prostopadłościanu. Wtedy długość drugiej z krawędzi podstawy jest równa  $x + 3$ . Oznaczmy też literą  $h$  długość trzeciej z krawędzi prostopadłościanu. Z treści zadania wynika, że

$$4x + 4(x + 3) + 4h = 52.$$

Stąd:

$$x + x + 3 + h = 13,$$

$$h = 10 - 2x.$$

Objętość  $V$  prostopadłościanu możemy zapisać jako funkcję zmiennej  $x$ , wzorem

$$V(x) = x(x + 3)(10 - 2x) = -2x^3 + 4x^2 + 30x.$$

Dziedziną funkcji  $V$  jest zbiór takich wartości  $x$ , że  $x > 0$  i  $10 - 2x > 0$ , a więc  $0 < x < 5$ .

Pochodna funkcji  $V$  jest równa

$$V'(x) = -6x^2 + 8x + 30, x \in (0, 5).$$

Obliczmy miejsca zerowe i zbadajmy znak pochodnej:

$V'(x) = 0$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $-6x^2 + 8x + 30 = 0$ , stąd  $x = -\frac{5}{3}$  lub  $x = 3$ .

Uwzględniając dziedzinę funkcji, mamy:

$V'(x) > 0$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $x \in (0, 3)$ ;

$V'(x) < 0$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $x \in (3, 5)$ .

Zatem funkcja  $V$  jest w przedziale  $(0, 3)$  rosnąca, a w przedziale  $(3, 5)$  malejąca. Wynika stąd, że dla  $x = 3$  funkcja  $V$  ma maksimum lokalne, które jest jednocześnie jej największą wartością.

Gdy  $x = 3$ , to wtedy  $x + 3 = 6$  oraz  $h = 10 - 2x = 4$ . Objętość prostopadłościanu jest wtedy równa

$$V_{\max}(3) = 3 \cdot 6 \cdot 4 = 72.$$

### Schemat punktowania

Rozwiązanie zadania składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap składa się z trzech części:

a) wprowadzenie oznaczeń, np.  $x$ ,  $x + 3$ ,  $h$ , oraz zapisanie równania wynikającego z warunków zadania:  $2x + h = 10$ ,

b) zapisanie objętości prostopadłościanu jako funkcji zmiennej  $x$ :

$$V(x) = x(x + 3)(10 - 2x) = -2x^3 + 4x^2 + 30x,$$

c) określenie dziedziny funkcji  $V$ :  $0 < x < 5$ .

Za każdą z części tego etapu zdający otrzymuje po **1 punkt**, przy czym jeśli zdający od razu zapisze objętość prostopadłościanu w zależności od zmiennej  $x$ , to otrzymuje punkt za część a) i punkt za część b).

Drugi etap składa się z trzech części:

a) wyznaczenie pochodnej funkcji  $V$ :  $V'(x) = -6x^2 + 8x + 30$ ,

b) obliczenie miejsca zerowego pochodnej:  $x = 3$ ,

c) wyznaczenie przedziałów monotoniczności funkcji  $V$  i uzasadnienie, że dla  $x = 3$  funkcja  $V$  osiąga największą wartość.

Za poprawne rozwiązanie każdej z części tego etapu zdający otrzymuje **1 punkt**, o ile poprzednia część etapu została zrealizowana bezbłędnie.

Trzeci etap.

Obliczenie objętości prostopadłościanu o największej objętości:  $V_{\max} = 72$ .

Za poprawne rozwiązanie tego etapu zdający otrzymuje **1 punkt**.